MANUEL D'UTILISATION
Lire attentivement ces instructions avant utilisation

Bydureon 2 mg poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée en stylo prérempli
Comment utiliser le stylo prérempli Bydureon



Avant d'utiliser le stylo, il est préférable d'avoir été formé à son utilisation correcte par un professionnel de santé.
Ce dispositif n'est pas recommandé pour les personnes non voyantes ou malvoyantes à moins qu'une personne formée puisse apporter son aide pour l'injection de ce médicament.

Étape nº 1 : Préparation de votre stylo
Laissez votre stylo se réchauffer. Retirez un stylo du réfrigérateur et laissez-le à température ambiante pendant au moins 15 minutes. **NE PAS** utiliser un stylo dont la date de péremption est dépassée.

Pendant que le stylo se réchauffe, lavez-vous les mains.
Ouvrez le conditionnement en tirant sur la languette située au coin. Retirez alors le stylo et l'aiguille. **NE PAS** utiliser votre stylo ou une aiguille si l'un des composants est brisé ou manquant.



Vérifiez le liquide se trouvant à l'intérieur de la fenêtre d'inspection. Il doit être limpide et sans particule. Il est normal de voir des bulles d'air dans le liquide.



Retirez la pellicule de papier du capuchon de l'aiguille.

Fixez l'aiguille sur le stylo en la poussant et en la vissant sur l'extrémité supérieure du stylo jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. **NE PAS** retirer le capuchon de l'aiguille à ce stade.



Étape n° 2 : Mélangez votre dose
Reconstituez le médicament. Tout en maintenant le stylo à la verticale avec le capuchon de l'aiguille vers le haut, tournez **lentement** la molette dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. **ARRÊTEZ** lorsque vous entendez le clic et que l'étiquette verte disparaît.



Tapez fermement le stylo pour mélanger. Tenez le stylo par l'extrémité où se trouve l'étiquette orange et **tapez fermement le stylo contre la paume de votre main plusieurs fois**. **SANS** tourner la molette, **PIVOTEZ** le stylo après chaque série. Tapez fermement le stylo prérempli jusqu'à l'obtention d'une suspension uniformément trouble sans particule. Vous pouvez avoir besoin de taper le stylo 80 fois ou plus.

Vérifiez la suspension. Maintenez le stylo à la lumière et regardez à travers les deux côtés de la fenêtre de mélange. La solution ne doit contenir **AUCUNE PARTICULE** et doit être uniformément trouble.



Pour obtenir la dose complète, le médicament doit être correctement mélangé.

S'il n'est pas correctement mélangé, tapez plus longuement et plus fermement.

NE PAS poursuivre la procédure si le médicament n'est pas bien mélangé.

Pour obtenir la dose complète, le médicament doit être correctement mélangé. S'il n'est pas bien mélangé, tapez plus longuement et plus fermement. C'est normal si vous voyez des bulles d'air dans le liquide et elles ne causeront pas de mal.

Comparez les deux côtés de la fenêtre de mélange avec les photos ci-dessous en plaçant le stylo contre la page. Soyez attentif à la **surface inférieure**. Si vous **ne voyez aucune particule**, vous pouvez pratiquer l'injection.



Étape nº 3 : Injectez votre dose

IMPORTANT Lorsque le médicament est bien mélangé, vous devez injecter la dose immédiatement. Vous ne devez pas la conserver pour une utilisation ultérieure.

Choisissez votre site d'injection au niveau de l'abdomen, de la cuisse ou de la face arrière du bras. Chaque semaine vous pouvez utiliser la même zone du corps, mais choisissez un site d'injection différent dans cette zone. **Nettoyez doucement la zone** à l'eau et au savon ou avec un coton alcoolisé.



Tournez la molette pour libérer le bouton d'injection. Tout en maintenant **le stylo vertical**, tournez la molette jusqu'à ce que l'étiquette orange disparaisse et que le bouton d'injection soit libéré. **NE PAS** pousser le bouton d'injection à cette étape.



Retirez le capuchon de l'aiguille en restant dans l'axe. **NE PAS** tourner. Vous pourrez éventuellement voir quelques gouttes de liquide sur l'aiguille ou dans le couvercle.

Injectez le médicament. Insérez l'aiguille dans la peau (par voie sous-cutanée). Appuyez sur le bouton d'injection avec votre pouce jusqu'à ce que vous entendiez un clic. **Maintenez enfoncé pendant 10 secondes** pour vous assurer que la dose a été entièrement injectée.

Éliminez votre stylo de manière adéquate, l'aiguille toujours fixée, dans un récipient pour déchets coupants et tranchants. **NE PAS** essayer de replacer le capuchon ni de réutiliser l'aiguille.

Questions et réponses fréquentes

1. **Comment puis-je savoir que le médicament est bien mélangé ?**
   Le médicament est bien mélangé lorsque le liquide apparaît trouble des deux côtés de la fenêtre. Vous ne devez voir aucune particule dans le liquide. Il peut être utile de maintenir le stylo devant une lumière pour voir au travers de la fenêtre. Si vous voyez des particules, quelle que soit leur taille, tapez fermement le stylo contre la paume de votre main jusqu'à un mélange parfait.
2. **J'ai des difficultés à mélanger ma dose. Que dois-je faire ?**
   Avant de préparer votre dose, souvenez-vous de laisser le stylo hors du réfrigérateur pendant au moins 15 minutes. Cela permettra au stylo de se réchauffer à température ambiante. Il sera plus facile de mélanger le médicament si le stylo est à température ambiante.
   Assurez-vous de tenir le stylo à l'extrémité où se trouvent la molette et l'étiquette orange. Cela vous aidera à avoir une meilleure prise du stylo et à le taper plus fermement contre la paume de votre main.
   Cela peut également aider de taper la fenêtre de mélange des deux côtés contre votre paume. Si vous apercevez encore des particules, continuez à taper le stylo.
3. **Après avoir mélangé le médicament, combien de temps puis-je attendre avant de faire l'injection ?**
   Vous devez injecter votre dose immédiatement après avoir effectué le mélange. Si vous n'effectuez pas immédiatement l'injection de votre dose, de petites particules de médicament peuvent se former dans le stylo et vous pouvez ne pas recevoir une dose complète.
4. **Je suis prêt à injecter ma dose. Que dois-je faire si je vois des bulles d'air dans le stylo ?**
   La présence de bulles d'air dans le stylo est normale. Le médicament est injecté dans votre peau (par voie sous-cutanée). Les bulles d'air n'entraîneront aucun effet nocif et n'affecteront pas votre dose avec ce type d'injection.
5. **Que dois-je faire si je n'arrive pas à pousser complètement le bouton d'injection lorsque j'essaie d'injecter ma dose ?**
   Vérifiez que l'aiguille du stylo est entièrement vissée. Assurez-vous également d'avoir tourné la molette jusqu'à ce qu'elle soit bloquée, que l'étiquette orange ait bien disparu et que le bouton d'injection apparaisse.
   Si vous ne pouvez toujours pas pousser le bouton, cela signifie que l'aiguille est bouchée. Retirez l'aiguille de votre peau et remplacez-la par l'aiguille de rechange fournie dans l'emballage. Revoyez comment fixer l'aiguille. Puis choisissez un site d'injection différent afin de finir l'injection.
   Si vous ne pouvez toujours pas pousser le bouton entièrement, retirez l'aiguille de la peau. Utilisez un récipient pour déchets piquants et tranchants pour jeter le stylo avec l'aiguille encore fixée.
6. **Comment puis-je savoir que j'ai injecté la dose complète ?**
   Afin d'être sûr d'avoir reçu une dose complète, appuyez sur le bouton d'injection avec votre pouce jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Après le clic, continuez à maintenir l'aiguille dans votre peau pendant 10 secondes. Cela laissera suffisamment de temps pour que tout le médicament passe du stylo dans votre peau.
7. **Comment dois-je éliminer mon stylo Bydureon ?**
   Vous devez disposer d'un récipient pour déchets coupants et tranchants suffisamment large pour contenir le stylo en entier avec l'aiguille encore fixée. Assurez-vous que le récipient est muni d'un couvercle. Vous pouvez utiliser un récipient pour déchets biologiques, un récipient quelconque en plastique dur ou un récipient en métal. L'emballage ne contient pas de récipient pour déchets.